



Nadun buraga

Nadun buraga je stanje u kojem dolazi do prekomernog nakupljanja gasova u buragu u obliku penušavog sadržaja ili u obliku slobodnog gasa iznad sadržaja buraga pri čemu dolazi do istezanja zida buraga. Nadun se najčešće javlja kod goveda, zatim ovaca, a retko kod koza.

Uzroci koji dovode do naduna buraga mogu biti primarni i sekundarni.

Glavni uzroci naduna buraga su:

- ✓ ispaša životinja u rano proleće, leto i početkom jeseni kada su pašnjaci bujni, vlažni i kada lišće sadrži velike količine solubilnih belančevina;
- ✓ nagli prelaz sa zimske ishrane na pašu;
- ✓ prekomernim davanjem hrane koja lako vri (timpanogena hraniva), ishrana kominom, džibrom, pokvarenim krompirom, lišćem od kupusa, kokotcem, repinim lišćem, repom, mladim zelenim kukuruzom, tropom, otrovnim biljkama i dr.
- ✓ ispaša mladom travom koja je bogata belančevinama i leguminozama pre cvetanja (lucerka najopasnija, zatim detelina);
- ✓ ishrana repicom, graškom, pasuljom, sitno mlevenim žitaricama i leguminozama u većoj količini;
- ✓ ishrana koncentratima sa malim udelom kabaste hrane;
- ✓ ishrana na pašnjacima koji se preterano đubre urejom
- ✓ prekomerna ishrana koncentratima + davanje lucerkinog sena
- ✓ davanje hrane koja sadrži veću količinu lakosvarljivih ugljenih hidrata
- ✓ napajanje stoke neposredno pre i posle ispaše
- ✓ davanje sveže pokošene trave i sveže iskljalog zrnevlja
- ✓ nagli prelazak sa ishrane mlekom na ishranu kabastim hranivima kod teladi

