



Saveti za odgoj tovljenika

Da bi mogli računati u budućnosti na određeni broj tovljenika, moramo obratiti pažnju na svako prasce i to ne samo posle prašenja, nego i u samoj utrobi majke.

Normalno prašenje traje 2-3 sata, ali može da varira od 1-10 sati. Ukoliko prasad nisu avitalna, prosečna težina je od 1,2 do 1,4 kg po prasetu.

Na samom prašenju treba pratiti:

- da li prasad izlaze u pravilnim intervalima;
- obezbediti krmači mir;
- ukoliko je potrebno dodatno zagrejati prasad;
- dati oksitocin krmači (zbog lučenja mleka, a i kontrakcija materice);
- skratiti pupčanu vrpcu;
- obrisati prasad;
- i možda najbitnija stavka je obezbediti prasadima da posisaju kolostrum.

Krmača predaje antitela prasadima preko kolostruma. Prvi dan u životu prasadi je dan kolostruma i tada im treba posvetiti maksimalnu pažnju da posisaju kolostrum.

Svaki tretman koji se radi kod prasadi treba uraditi drugi dan. Tu spadaju:

- kastracija;
- tetoviranje;
- brušenje zuba;
- sečenje repova;
- davanje gvozdja.





inberg.rs

Sve gore navedene tretmane je poželjno uraditi drugi dan i više ne uznemiravati prasid za vreme laktacije i time maksimalno smanjiti broj stresiranja prasadi. Sva prasid imaju potrebu za gvozdem, da bi se sprecila anemija, jer novorođena prasid prakticno nemaju rezerve gvozđa, a mleko krmače sadrži malu kolicinu gvozđa koja nije dovoljna da ispuni potrebe prasadi.

Od ukupnog broja uginuća prasadi u prasilištu oko 50% cine uginuća nastala u prva 2-3 dana. Mora se obratiti pažnja na ishranu krmače u laktaciji i povećavati količinu hrane srazmerno trajanju laktacije i veličine legla.

Prasid koja nemaju dovoljnu težinu na zalučenju, mogu biti ostavljena na produženo dojenje ili im omogućiti pigi jogurt u sekciji odgoja.

U prvih tri nedelje za rast prasadi je dovoljno krmačino mleko, mada mozemo početi sa prihranjivanjem i privikavanjem na koncentrovanu hranu vec od 10. dana života.

Kada prase jednom počne da jede hranu kojom ga prihranjujemo, neće biti problema za dalji period. Te kolicine su na početku veoma male, jedna šaka hrane je dovoljna za 12 prasadi do 2 nedelje starosti.

Osim na hranu, prasid moraju da se naviknu i na unošenje vode koja im je neophodna od druge nedelje zivota. Veoma je bitno je da voda bude čista i sveža, nikako ustajala jer moze da sadrži veliki broj mikroorganizama.

Prasid bi trebalo po zalučenju hraniti u prvih sedam dana ograničeno.

Prasid zalucena sa 28 dana i prosecnom tezinom 7,5 kg bi u odgoju trebala da jedu u početku 100-150 g hrane dnevno, a kasnije u starosti od 75 dana i na izlasku iz odgoja oko 1,3 do 1,5 kg hrane dnevno.

Dnevni prirast u poslednjim danima odgoja je od 600 do 700 g. Sam proces zalučenja je veliki stres za prasid i njima treba dan dva da bi počeli normalno da konzumiraju hranu.

Da bi dobili dobru svinju moramo posvetiti maksimalnu pažnju prasetu.

Ne postoji najbolja krmača za sve situacije, najbolja je ona koja ispuni naše odgajivačke ciljeve.

**U PRASILISTU SE SPORO HODA, BRZO ZAPAŽA I MISLI, A JOS BRŽE DONOSE ODLUKE.
PROFITIRAJTE!**