



Saveti za pravilan odgoj pilića

Inberg proizvodi hranu za piliće vrhunskog kvaliteta. Žitarice koje se ulaze u sastav hrane za piliće su ekstrudirane kako bi bile lako-svarljive. Sve komponente se pre procesa proizvodnje termički tretiraju parom da bi se uništili štetni mikroorganizmi u sirovinama. Hrana sadrži potpuno prirodne i zdrave sirovine koje su isključivo biljnog porekla.

U proizvodnom procesu ne koristimo GMO komponente, proizvode kafilerija i ne prihvatom žitarice zagađene mikotoksinima. Sve sirovine su prilikom prijema u fabriči kontrolisane na mikotoksine (aflatoksin).



Saveti:

- pre samog useljenja pilića u objekat neophodno ga je temeljno očistiti i dezinfikovati;
- prostirka bi trebala da bude u sloju debljine 4-5cm kako bi se pilićima omogućilo ravnomerno kretanje i konzumiranje hrane. Ukoliko se za prostirku koristi pšenična ili ječmena slama poželjno je da bude seckana;
- 24 sata pre useljavanja pilića prostor zagrejati na potrebnu temperaturu od 32-34 stepena;
- održavati vlažnost vazduha u prostoru na 70-75% u prvih 10 dana, a kasnije na 50-60%. Redovnim provetrvanjem smanjujete vlažnost u objektu i eliminišete štetne gasove koji zagađuju sam prostor;
- nekoliko sati pre useljavanja pilića napunite pojilice vodom kako bi ona imala minimum 25 stepeni u trenutku kada se usele pilići;
- prva 2-3 sata pilićima treba obezbediti samo vodu, a nakon toga počnite sa hranjenjem odgovarajućim potpunim krmnim smešama za taj uzrast;

- prva 2-3 dana osvetljenje u objektu treba da bude neprekidno kako bi svako piletina našlo svoje mesto na hranilici i pojilici i upoznalo se sa okolinom. 3. dana se uvodi 1-2 sata mračnog perioda. Sviše jaka osvetljenost može prouzrokovati agresivno ponašanje i pojavu kanibalizma među pilićima;
- preporuka je da prvih 5-7 dana koristite hranilice sa velikom površinom kako bi hrana bila dostupna svim pilićima. Hranilice u početnoj fazi punite do četvrtine, maksimalno do polovine, jer u tom uzrastu je mala potrošnja, a dužim stajanjem hrane na visokoj temperaturi dolazi do slabljenja njene hranjive vrednosti i mogućeg kvara;
- koristite potpune krmne smeše za odgovarajući uzrast pilića u drobljenom i peletiranom obliku kako bi smanjili rastur hrane, raslojavanje komponenti i obezbedili da pilići svakim zalogajem uzmu sve što im je neophodno od hranjivih sastojaka.